

選擇題：每小題 5 分，請於試卷內之「選擇題作答區」依序作答。

- 以下何種治療骨質疏松藥物，不會產生顎骨壞死之風險？  
(A) Aclasta (B) Fosamax (C) Bonviva (D) Forteo
- 有牙關緊閉，但無明顯的顏面腫脹的組織間隙感染(space infections)，大多發生在以下何組織間隙？  
(A) buccal space (B) submandibular space (C) pterygomandibular space (D) sublingual space
- 下顎骨發生骨髓炎時最常被培養出來的菌種為：  
(A) Staphylococci (B) Fusobacterium (C) Prevotella (D) Candida spp.
- 下列那一種疾病主要是由慢性念珠菌感染 (chronic candidal infection) 而引起？  
(A) 白色海綿痣 (white spongy nevus) (B) 地圖舌 (geographic tongue) (C) 正中菱形舌炎 (median rhomboid glossitis) (D) 扁平苔癬 (lichen planus)
- 若單側 hypoglossal nerve 損傷，導致舌伸出時會偏向損傷側，這是因下列何肌肉將健全側一邊之舌往前拉之故？  
(A) Genioglossus m. (B) Palatoglossus m. (C) Styloglossus m. (D) Hyoglossus m.
- 一個健康的成人，體重 70 公斤重，若是以 2% lidocaine (1:100000 epinephrine) 來做局部麻醉，最大劑量不可超過幾罐麻藥？  
(A) 7 (B) 8 (C) 9 (D) 10
- 右頰黏膜上發現一快速生長之腫塊，最大徑長 3 公分，頸部有一 1.5 公分之可動淋巴結，切片檢查報告為鱗狀細胞癌，影像檢查右側頸部疑有一 2.2 公分淋巴結轉移，依美國癌症委員會之 TNM 分期，屬於臨床那一期口腔癌？  
(A) T1N1M0 (B) T2N0M0 (C) T2N1M0 (D) T2N2M0
- 最可能同時會造成 nasoorbital-ethmoid complex 和 zygomatic fracture 的是那一種的中顏面骨折？  
(A) Le Fort I fracture (B) Le Fort II fracture (C) Le Fort III fracture (D) zygomatic complex fracture
- 要知道病人凝血功能是否正常，最好的試驗是前凝血酵素時間 (prothrombin time)，該試驗的標準控制值大約為多少秒？  
(A) 12 (B) 24 (C) 36 (D) 48
- 口腔癌術後放射線治療之絕對適應症，下列何者錯誤？  
(A) 不適當之切除邊緣 (B) 有淋巴結外之侵犯 (C) 分化差之腫瘤 (D) 多處頸部淋巴轉移
- 頸部淋巴可依據解剖學的構造區分為 level 1 到 level 6，口腔癌肩胛舌骨上頸部淋巴廓清術 (selective neck dissection) 之清除區域為下列何者？  
(A) Level 1,2,3 (B) Level 2,3,4 (C) Level 3,4,5 (D) Level 4,5,6
- 下列何種病變可用刮除術的方法治療？  
(A) Ameloblastic odontoma (B) Ameloblastic fibrosarcoma (C) Ameloblastic fibroma (D) Ameloblastoma
- 在施行口腔手術時，為避免心內膜炎的發生，何種情形需要抗生素預防性投藥？  
(A) 僧帽瓣逆流 (mitral valve regurgitation) (B) 單純性心房中隔缺損 (isolated atrial septal defect) (C) 功能性心雜音 (functional heart murmur) (D) 冠狀動脈繞道手術 (coronary artery bypass graft)
- 牛角鉗 (cow-horn forceps) 主要是用來拔那一顆牙齒？  
(A) 上顎大白齒 (B) 下顎大白齒 (C) 上顎小白齒 (D) 下顎小白齒
- 下顎前移術 (mandibular advancement) 最常用的術式是：  
(A) 兩側矢向劈裂截骨術 (bilateral sagittal split osteotomy) (B) 垂直截骨術 (vertical osteotomy) (C) 骨體截骨術 (body osteotomy) (D) 前下顎根尖下截骨術 (anterior mandibular subapical osteotomy)
- 以下何種唾液腺癌，臨床上有容易產生肺部轉移及神經侵犯等特徵？  
(A) adenocarcinoma (B) mucoepidermoid carcinoma (C) adenocystic carcinoma (D) acinic cell carcinoma
- 齒源性感染最常見來自菌種，除了好氧之格蘭氏陽性球菌外，其次為？  
(A) 好氧之格蘭氏陰性桿菌 (B) 厭氧之格蘭氏陽性桿菌 (C) 厭氧之格蘭氏陰性球菌 (D) 厭氧之格蘭氏陰性桿菌
- Ludwig's Angina 是一種極嚴重之頭頸部感染，它同時侵犯多處組織間隙 (tissue space)，但並不包括？  
(A) buccal space (B) submental space (C) submandibular space (D) sublingual space
- 下列何者唾液腺分泌之唾液量最多？  
(A) sublingual gland (B) parotid gland (C) submandibular gland (D) buccal gland
- 以下有關 Fordyce's spot 之描述何者錯誤？  
(A) 為黏膜下 sebaceous gland 之腫大 (B) 呈黃色可見之顆粒 (C) 年輕人較常見 (D) 多位於頰黏膜