

一、請簡要回答以下問題。(共 20 分)

- (1) 何謂運動性失用症 (motor apraxia) ?
- (2) 請列舉三項其於日常生活活動的常見臨床表徵。
- (3) 採用認知策略訓練 (Cognitive Strategy Training, CST) 進行上述個案的日常生活活動訓練，請說明此訓練的基本原則。
- (4) 依據前題的認知策略訓練原則，針對「起始任務」(initiate task) 有困難的個案，請提出三項介入策略。

二、以下是臨床對於低視能 (low vision) 個案常會採用的介入策略，請簡要介紹各種策略，並舉例簡要說明如何執行這些策略協助低視能個案。(共 20 分)

- (1) Relative distance magnification (6%)
- (2) Relative size magnification (6%)
- (3) Preferred retinal loci training (8%)

三、請列舉三項中風後上肢動作功能損傷之當代治療策略，並簡要說明其基本原則、進行方式及與適用對象。(共 20 分)

四、感覺再教育 (sensory reeducation) 為臨床上常用於體感覺問題的主動感覺訓練 (active sensory training) 方式，請說明此介入方式之核心概念、進行方式及適用對象。(共 20 分)

五、請簡要說明臨床推理有哪些類型，以及各類型臨床推理之核心概念。(共 20 分)

試題隨卷繳回